

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Durante su aplicación utilizar guantes (de preferencia de nitrilo), protector facial y botas, que impidan el contacto del producto con la piel.
- Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo.
- No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento.
- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.
- Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa.
- Lave con abundante agua los equipos utilizados en la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, buscar atención médica inmediatamente, NO provoca el vómito.
- En caso de inhalación trasladar al paciente al aire fresco y vigilar su respiración.
- Si entra en contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por un periodo de 15 minutos, tratando de abrir los párpados ocasionalmente.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de emergencia llamar a: CETOX telf.: 0800-71911, ESSALUD telf.: 411-8000 opción 4; DROKASAPERÚ S.A. telf.: 501-1000
- Nota al médico: Tratamiento sintomático y de sostén. No tiene antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- “Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado”
- “Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase”

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Respete las dosis y época de aplicación del producto.
- No vierta el remanente del producto ni los envases vacíos o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

COD.



KOZZO®

EXTRACTO VEGETAL

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN

Aceite de árbol de té (*Melaleuca alternifolia*)..... 223 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PBUA N° 106 - SENASA - PBA - EV

TITULAR DE REGISTRO:

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9,
Magdalena del Mar. Lima - Perú
Telf.: 501 - 100



FORMULADO POR:
CELAGRI SPAIN SLU.
Calle Levante U.D. 2 - Pta 14,
Almassera 46132, Valencia - España

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 L

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

KOZZO es un fungicida a base de extractos vegetales del Árbol de Té (*Melaleuca alternifolia*), actúa de forma preventiva y curativa mediante la inhibición del desarrollo de la germinación de esporas, inhibición del crecimiento del micelio y lesión expansiva; produce inhibición en la producción de esporangios, mediante supresión y erradicación de colonias de los patógenos presentes en los frutos y hojas.

Preparación y aplicación

KOZZO se prepara diluyendo previamente la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido. Durante la preparación de la emulsión y luego durante la aplicación del producto, mantener en marcha el sistema de agitación. Se recomienda que el pH del agua para mezcla sea entre 6 y 7.

Aplicar cuando las condiciones climáticas sean favorables, evitar horas de alta insolación, no aplicar durante o después de lluvia, ya que el escurrimiento podría ocasionar la pérdida del producto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PC (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arándano	“Podredumbre gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5 - 2.0	NA	NA
Vid	“Podredumbre gris o moho gris”	<i>Botrytis cinerea</i>	1.5 - 2.0	NA	NA

PC: Período de carencia

LMR: Límite máximo de residuo

NA: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: En época de floración o fructificación, de forma preventiva cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno y de forma curativa cuando aparezcan los primeros signos de *Botrytis cinerea*. Se recomienda una sola aplicación y realizar como máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 7 a 14 días por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese al área tratada hasta 6 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: De preferencia aplicar este producto solo. Se recomienda efectuar una confirmación previa de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas e instrucciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”



PRECAUCIÓN

