

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE

- Este producto está clasificado como ligeramente tóxico. Durante su preparación y aplicación se recomienda poner en práctica todas las medidas generales de precaución que se usan para los plaguicidas de esta categoría.
- No ingerir este producto
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contaminación, enjuague bien con agua las áreas expuestas.
- En caso de ingestión, puede producir trastorno estomacal.
- En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- **En caso de emergencia llamar a:**
CICOTOX telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD telf.: 423-7600.

NOTA AL MÉDICO

Tratamiento sintomático y de sostén.

DL₅₀ Oral > 2,000 mg/kg
DL₅₀ Dermal > 4,000 mg/kg
CL₅₀ Inhalatoria > 5.0 mg/kg

Antídoto: No tiene antídoto específico.

NOTA AL COMPRADOR

“El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para el uso siguiendo las instrucciones dadas”.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

CustomBio NC

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Paecilomyces lilacinus, *Hirsutella rhossiliensis*, *Arthrobotrys oligospora*,
Acremonium butyri, *Bacillus chitinosporus*, *Bacillus firmus*.....10 g/L
Alcohol..... 5 g/L
Agua.....c.s.p 1000 ml
8 x 10¹¹ UFC por litro

NEMATOCIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg PBUA N° 370 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000

FABRICADO POR: **CUSTOM BIOLOGICALS INC.**
1239 East Newport Center Drive Suite #117
Deerfield Beach, Florida 33442 USA

FORMULADO POR: **NATURALITE S.A.**
Tratamientos Biológicos & Soluciones Ambientales
Cdla. Albatros, calle Fragata 103
Guayaquil, Guayas - Ecuador

DROKASA
PERU

FRASCO 1

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A

Contenido Neto: 1 Litro

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

INDICATIVOS DE USO

CustomBio NC, es un nematocida biológico de acción preventiva y de control de nemátodos. *CustomBio NC*, combina el modo de acción de 6 especies de microorganismos benéficos que garantizan la eficiencia en el control de nemátodos

Paecilomyces lilacinus: Parasita todos los estadios de nemátodos. El micelio crece alrededor del huevo de nemátodo penetrándolo y usándolo como alimento. Este hongo también penetra la cutícula del nemátodo y lo rodea. La hifa de este hongo también busca otras aperturas en donde atacar al nemátodo.

Hirsutella rhossiliensis: Produce conidias que se adhiere a los nemátodos al contacto. Estas conidias germinan y penetran la cutícula utilizando los contenidos internos como alimento y protección. Nuevas conidias son producidas cuando el alimento se acaba.

Arthrobotrys oligospora: Hongo atrapador de nemátodos.

Acremonium butyri: Es un ovicida de nemátodos. Este hongo produce una enzima polisacárida-hidrolizada que tiene cualidades de ovicida.

Bacillus chitinosporus: Una bacteria que produce enzimas de quitinaza que degrada huevos de nemátodos.

Bacillus firmus: Una bacteria de alta motilidad que produce fitohormonas y solubiliza fosfato. Especialmente reconocida por ser efectiva contra *Meloidogyne spp.* Sobrevive en suelos salinos.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Los hongos y los bacillus han sido separados en 2 frascos diferentes: En el frasco CUSTOMBIO NC-1 se encuentra los hongos y en el frasco CUSTOMBIO NC-2 se encuentran los bacillus.

Si prepara la dosis de 4 L/ha debe utilizar 2 litros de CUSTOMBIO NC-1 + 2 litro de CUSTOMBIO NC-2

Si prepara la dosis de 200 L (2 cilindros/ha) se debe aplicar 1 litro CUSTOMBIO NC-1 + 1 litro CUSTOMBIO NC-2.

Método de aplicación

- Se puede aplicar sobre el suelo al momento de la preparación del suelo (antes de pasar la rastra o turbar).
- Se puede aplicar en drench a cuello de planta, luego de un riego, con un gasto mínimo de 600 Litros o 3 cilindros de caldo de aplicación.
- Se puede aplicar vía sistema de riego tecnificado.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS/ha		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	Aplicación		
Ají páprika, pimiento piquillo, morron	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	4	Fracccionar la dosis: 1ra 10 días después del trasplante 1 L CustomBio NC-1 + 1 L CustomBio NC-2 2da 20 días después de la 1ra aplicación 1 L CustomBio NC-1 + 1 L CustomBio NC-2	*	*

PC: Período de carencia
* No aplica

LMR: Límite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

Por su modo de uso no se recomienda hacer mezclas con otros plaguicidas de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación.

**“MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS
ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS”**



**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN**

**“DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO”**



“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE, TRANSPORTE

- Este producto está clasificado como ligeramente tóxico. Durante su preparación y aplicación se recomienda poner en práctica todas las medidas generales de precaución que se usan para los plaguicidas de esta categoría.
- No ingerir este producto
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contaminación, enjuague bien con agua las áreas expuestas.
- En caso de ingestión, puede producir trastorno estomacal.
- En caso de ingestión busque atención médica inmediata.
- Si entra en contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- **En caso de emergencia llamar a:**
CICOTOX telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD telf.: 423-7600.

NOTA AL MÉDICO

Tratamiento sintomático y de sostén.

DL₅₀ Oral > 2,000 mg/kg
DL₅₀ Dermal > 4,000 mg/kg
CL₅₀ Inhalatoria > 5.0 mg/kg

Antídoto: No tiene antídoto específico.

NOTA AL COMPRADOR

“El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química de la etiqueta y es apto para el uso siguiendo las instrucciones dadas”.

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

CustomBio NC

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Paecilomyces lilacinus, *Hirsutella rhossiliensis*, *Arthrobotrys oligospora*,
Acremonium butyri, *Bacillus chitinosporus*, *Bacillus firmus*.....10 g/L
Alcohol..... 5 g/L
Agua.....c.s.p 1000 ml
8 x 10¹¹ UFC por litro

NEMATICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg PBUA N° 370 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000

FABRICADO POR: CUSTOM BIOLOGICALS INC.
1239 East Newport Center Drive Suite #117
Deerfield Beach, Florida 33442 USA

FORMULADO POR: NATURALITE S.A.
Tratamientos Biológicos & Soluciones Ambientales
Cdla. Albatros, calle Fragata 103
Guayaquil, Guayas - Ecuador

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A

Contenido Neto: 1 Litro

Número de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

DROKASA
PERU

FRASCO 2

INDICATIVOS DE USO

CustomBio NC, es un nematocida biológico de acción preventiva y de control de nemátodos. **CustomBio NC**, combina el modo de acción de 6 especies de microorganismos benéficos que garantizan la eficiencia en el control de nemátodos

Paecilomyces lilacinus: Parasita todos los estadios de nemátodos. El micelio crece alrededor del huevo de nemátodo penetrándolo y usándolo como alimento. Este hongo también penetra la cutícula del nemátodo y lo rodea. La hifa de este hongo también busca otras aperturas en donde atacar al nemátodo.

Hirsutella rhossiliensis: Produce conidias que se adhiere a los nemátodos al contacto. Estas conidias germinan y penetran la cutícula utilizando los contenidos internos como alimento y protección. Nuevas conidias son producidas cuando el alimento se acaba.

Arthrobotrys oligospora: Hongo atrapador de nemátodos.

Acremonium butyri: Es un ovicida de nemátodos. Este hongo produce una enzima polisacárida-hidrolizada que tiene cualidades de ovicida.

Bacillus chitinosporus: Una bacteria que produce enzimas de quitinaza que degrada huevos de nemátodos.

Bacillus firmus: Una bacteria de alta motilidad que produce fitohormonas y solubiliza fósforo. Especialmente reconocida por ser efectiva contra *Meloidogyne spp.* Sobrevive en suelos salinos.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Los hongos y los bacillus han sido separados en 2 frascos diferentes: En el frasco CUSTOMBIO NC-1 se encuentran los hongos y en el frasco CUSTOMBIO NC-2 se encuentran los bacillus.

Si prepara la dosis de 4 L/ha debe utilizar 2 litros de CUSTOMBIO NC-1 + 2 litros de CUSTOMBIO NC-2

Si prepara la dosis de 200 L (2 cilindros/ha) se debe aplicar 1 litro CUSTOMBIO NC-1 + 1 litro CUSTOMBIO NC-2.

Método de aplicación

- Se puede aplicar sobre el suelo al momento de la preparación del suelo (antes de pasar la rastra o turbar).

- Se puede aplicar en drench a cuello de planta, luego de un riego, con un gasto mínimo de 600 Litros o 3 cilindros de caldo de aplicación.

- Se puede aplicar vía sistema de riego tecnificado.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS/ha		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	Aplicación		
Ají páprika, pimiento, piquillo, morrón	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	4	Fracccionar la dosis: 1ra 10 días después del trasplante 1 L CustomBio NC-1 + 1 L CustomBio NC-2 2da 20 días después de la 1ra aplicación 1 L CustomBio NC-1 + 1 L CustomBio NC-2	*	*

PC: Período de carencia

* No aplica

LMR: Límite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

Por su modo de uso no se recomienda hacer mezclas con otros plaguicidas de uso agrícola.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad cuando se ha usado siguiendo las recomendaciones de dosis y época de aplicación.

“MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS
ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINAS”



LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN

“DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO”

