"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Solo para aplicación foliar.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo químico: Neonicotinoide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a**:
  CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó
  ESSALUD Telf.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de recuperación.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
"Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto o desechos de envases vacíos".
"No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los restos o sobrantes y envases vacíos".
"Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en épocas de floración".
"No aplicar directamente al suelo. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin".

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

DK-PRID® 35% SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Imidacloprid	350 g/l
Aditivos	650 g/l
TOTAL	1000 g/l

Reg. PQUA Nº 071-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: **DROKASA PERÚ S.A.**
Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
Telf.: 501-1000

FABRICADO Y FORMULADO POR: SUNDAT (S) PTE LTD
26 Gul Crescent Singapore 629532

DROKASA PERU

REENVASADO POR: **DROKASA PERÚ S.A.**
Av. Marcos Farfán Nº 3459 Urb. Industrial - Independencia.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 20 Litros

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

AGITE ESTE ENVASE ANTES DE ABRIRLO Y UTILIZARLO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
DK-PRID 35% SC es un insecticida altamente sistémico elaborado a base de Imidacloprid, ingrediente activo que posee acción de contacto e ingestión. Es utilizado para el control de plagas de cultivos agrícolas, las aplicaciones van directamente vía foliar o sistema de riego tecnificado.
DK-PRID 35% SC se puede preparar diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ml/200 L	L/ha		
Mandarina	Minador de los cítricos	*Phyllocnistis citrella*	75 - 100	-	30	1
	Caracha (Mosquilla de los brotes)	*Prodiplosis longifila*	100 - 150	-	30	1
	Pulgón negro de los cítricos	*Toxoptera aurantii*	100 - 150	-	30	1
Espárrago	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	3	0.05
Cebolla	Trips	*Thrips tabaci*	150 - 200	-	21	0.05
Holantao	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	ND	4
Tomate	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	3	0.1
Algodón	Pulgón	*Aphis gossypii*	75 - 100	-	14	4
Páprika	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	7	0.5
Palto	Queresa parda	*Coccus hesperidium*	150 - 200	-	14	0.05
Papa	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	21	0.5
	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	200 - 250	-	7	0.5
Vid*	Filoxera de la vid	*Viteus vitifoliae*	-	1.5 - 2.0	30	1
	Mosquilla de los brotes	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	-	30	1
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	*Tagosodes (=Sogatodes) orizicolus*	-	0.1 - 0.15**	30	1.5
Manzano	Pulgón verde del manzano	*Aphis pomi*	100 - 150	-	14	0.5

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia ND: No determinado
* Dosis recomendada para aplicaciones vía sistema de riego tecnificado **Volumen de agua recomendado 200 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN Realizar un máximo dos aplicaciones por campaña.
PERÍODO DE REINGRESO No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD: DK-PRID 35% SC es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina y productos foliares.
FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.
RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".