

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir. Este producto causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con los ojos, piel y ropa.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique el médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria, si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Antídoto: Aplicar Sulfato de atropina vía endovenosa o intramuscular en la dosis de 1 a 2 mg en adultos y 0.5 a 1 mg en niños.
- **En caso de emergencias llamar a: CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Telf.: 423-7600/117 o CISPROMQUIM: 0800-5-0847**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- “Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin”.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- **TÓXICO** para las abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores. No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



EXTRAFOS®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN

- Chlorpyrifos 480 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 1377 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991, piso 9, Magdalena del Mar.
Lima, Perú. Telf.: 501-1000

FORMULADO POR:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.
6th Floor Geoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750#
Jinan Shandong China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

® Marca Registrada



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

EXTRAFOS, es un insecticida a base de Clorpirifos con efecto traslaminar, que controla insectos masticadores y chupadores.

EXTRAFOS puede ser empleado en pulverizaciones al follaje con bomba de mochila manual o a motor y en aplicaciones aéreas cuando sea el caso.

EXTRAFOS, debe ser aplicado en momentos oportunos para evitar daños extremos de las plagas en los cultivos.

EXTRAFOS, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC días	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	ml/200 L		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.8 - 1	400 - 500	7	0.05
	Caracha	<i>Prodiplosis longifolia</i>	1	500	7	0.5
Alfalfa	Pulgón del brote	<i>Acyrtosiphon pisum</i>	0.8	400	7	0.05
Vid	Chanchito blanco	<i>Pseudococcus sp</i>	1.5 - 2	-	7	0.5
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	1 - 1.5	-	35	0.5
Alcachofa	Comedor de brotes	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.8 - 1	400 - 500	7	1
Páprika	Gusano de tierra	<i>Agrotis sp</i>	0.8 - 1	400 - 500	7	0.5
Espárrago	Gusano de follaje	<i>Copitarsia corruda</i>	1 - 1.2	-	21	0.05
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	-	400 - 500	21	0.05
Holantao	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	400 - 500	21	0.05
	Gusano de tierra	<i>Agrotis ipsilon</i>	0.8 - 1	400 - 500	ND	0.05
Palto	Queresa coma	<i>Florinia floriniae</i>	-	400 - 500	14	0.05
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	400 - 500	14	0.05

LMR: Límite máximo de residuos en ppm PC: Período de carencia en días ND: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **EXTRAFOS** (i.a. Chlorpyrifos) una aplicación por campaña como máximo. De persistir la plaga, usar otro insecticida de diferente mecanismo de acción para evitar la resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EXTRAFOS, es compatible con la gran mayoría de los plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.

NOTA AL COMPRADOR

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

COD.

