

29 cms.

"LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FITOAMIN, es un Fertilizante nitrogenado con efecto bioestimulante a base de **Aminoácidos Libres**, obtenidos por hidrólisis enzimática de fácil asimilación por las hojas y por el sistema radicular de las plantas. Es un producto orgánico y natural que no afecta el medio ambiente.

FITOAMIN, es un producto agrícola que debe usarse indispensablemente cuando la planta está expuesta a condiciones adversas o estrés.

CARACTERÍSTICAS DE FITOAMIN

- Rápida asimilación, sin esfuerzo por parte de la planta.
- Los aminoácidos contenidos en **FITOAMIN** rápidamente forman parte de las proteínas.
- Solubilidad total en el agua.

BENEFICIOS DE FITOAMIN

- Aumenta el número de brotes y raíces.
- Favorece el cuajado y crecimiento de los frutos.
- Desintoxica a las plantas de plaguicidas.
- Actúa como nutriente de la fauna microbiana, activando la vida en el suelo.
- Incrementa la producción.
- Mejora la calidad de las cosechas.

PRECAUCIONES

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Guarde en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura a los ojos o la piel, lávese inmediatamente con abundante agua limpia.

COMPATIBILIDAD

El **FITOAMIN**, es compatible con mayoría de los plaguicidas, con excepción de los productos cúpricos: nunca aplicar en mezcla con fungicidas a base de cobre por posibles fitotoxicidades. No se puede mezclar con aceites minerales por incompatibilidad física. Con el azufre, evitar aplicaciones con temperaturas elevadas y sobre

ADVERTENCIA:

Úsese exclusivamente en la forma recomendada en la etiqueta.
No sobre pase la dosis indicada. La dosis varía de acuerdo a la edad y al área foliar de los cultivos, en general a mayor tamaño o edad le corresponde dosis mayores.

En general es más recomendable aplicar dosis baja a media en varias ocasiones, que una sola aplicación en dosis alta.

Las recomendaciones que facilitamos son fruto de rigurosos ensayos, sin embargo, durante su preparación y aplicación van a intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de la mezcla, método de aplicación, clima, etapa fenológica y estado nutricional de la planta, etc.). Se recomienda su aplicación con asistencia técnica.

El usuario será responsable por los daños causados por la inobservancia de las instrucciones dadas.

FITOAMIN[®]

(Aminoácidos Libres 24%)

AMINOACIDOS - ALTAMENTE ASIMILABLE

CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Nitrógeno Total.....6.7%
Aminoácidos Libres.....22-24%
Aminoácidos Totales.....42.5%
Carbono Orgánico.....22.0%

Contenido de aminoácidos			
Alanina	4.2 %	Lisina	1.4 %
Arginina	0.4%	Metionina	0.6%
Acido aspártico	1.3%	Ortinina	2%
Acido glutámico	4.0%	Fenilalanina	1.0%
Glicina	8.1%	Prolina	5.0%
Hidroxilisina	1.7%	Serina	0.2%
Hidroxiprolina	2.6%	Treonina	0.4%
Histidina	0.3%	Tirosina	1%
Isoleucina	0.7%	Valina	1.3%
Leucina	1.4%		

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Numero de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar N° 991, piso 9

Magdalena del Mar. Lima - Perú



© Marca Registrada

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Añada **FITOAMIN** directamente al cilindro o mochila, mueva la mezcla y proceda a su aplicación.

Se puede aplicar con mochila de palanca, a motor y también a través del sistemas de riego.

CUADRO DE DOSIFICACIONES Y USOS

Cultivos	Dosis ml/200 L	Observaciones
Algodón	300-500	1° aplicación antes de la floración 2° 15 a 20 días después
Cebolla y Ajo	300-500	1° aplicación a los 10 cm de altura 2° y 3° con intervalos de 15 a 20 días
Espárrago	300-500	1° aplicación en plantas de 20-30 cm 2° 30 días después 3° aplicación: 20 días antes del corte
Tomate y Hortalizas	300-500	1° aplicación al inicio del crecimiento antes de floración 2° y 3° a intervalos de 15 a 20 días
Maíz	300-500	1° Cuando la planta tenga de 4-8 hojas 2° 15 a 20 días después
Papa	300-500	1° Cuando la planta tenga de 5-6 hojas 2° y 3° a intervalos de 15 a 20 días
Páprika, Piquillo Alcachofa	350-500	1° aplicación después del trasplante 2° aplicación antes de la floración 3° aplicación durante el cuajado
Alfalfa	300-500	1° aplicación después del corte con 5 cm 2° aplicación: 15 días después
Leguminosas, Frijol, Hortalao	300-500	1° aplicación al crecimiento inicial 2° Antes de la floración 3° Al llenado de las vainas
Crucíferas: Col, Brócoli, Col china	300-500	1° A los 7 días del trasplante 2° Al crecimiento 3° 15 días después
Cucurbitáceas	300-500	1° aplicación con 3 hojas verdaderas 2° En pleno crecimiento 3° Antes de la floración 4° y 5° en desarrollo del fruto
Arroz	300-500	1° Punto de algodón 2° Inicio de floración
Marigold	300-500	1° 3-5 días después del trasplante 2° Al pre botoneo
Flores	300-500	1° Al inicio del crecimiento del follaje 2° Antes de la floración
Vid, Cítricos, Pailo, etc.	300-500	1° Antes de la floración 2° Con frutos de 2-3 cm de diámetro 3° y 4° con intervalos de 15 a 20 días

COD. 1303618 - V0

