SANADOR®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Fosetyl-Aluminium..... 800 g/kg
Aditivos ..... csp 1 kg

Reg. PQUA N° 591 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar N° 991 Piso 9, Magdalena del Mar
Lima - Perú. Teléfono: 501-1000

DROKASA
PERU

FABRICADO Y FORMULADO POR:
KINGTAI CHEMICALS CO., LTD.
9F, Huarong Times Mansion Hi-Tech Development Zone
Binjiang Hangzhou, China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 kg

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

“LEA TOTALMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto es nocivo si se ingiere”
- Puede causar sensibilización de la piel por contacto
- Causa irritación moderada a los ojos.
- “El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas”
- “Evite contacto con la piel y la ropa”
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sal de ácido fosfórico
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **En caso de EMERGENCIAS llamar a**: **CICOTOX Telf.: 0800-13040 (Atención 24 horas), ESSALUD Telf.: 423-7600 ó DROKASA PERÚ S.A. Telf.: 219-3901**
- NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes o envases vacíos del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin”.
- Después de usar el contenido destruya el envase y depositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para éste fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

SANADOR, es un fungicida preventivo y curativo contra las enfermedades causadas por oomicetos. Es sistémico, fácilmente absorbido por las plantas y rápidamente transportado vía xilema y floema, incluso hasta raíces y brotes que se forman después de las aplicaciones.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SANADOR , es utilizado en forma preventiva cuando se presentan las condiciones óptimas para el desarrollo de la enfermedad o cuando se advierte los primeros síntomas de la enfermedad, de preferencia al inicio del brotamiento. Se recomienda 1aplicación /campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada sin protección hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SANADOR, es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común excepto con los de reacción alcalina. Puede ser incompatible con fertilizantes foliares, aceites emulsionables y productos a base de cobre.

FITOTOXICIDAD

Usado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta, no se espera que se produzca problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/200L	PC días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Palta	Pudrición radicular	*Phytophthora cinnamomi*	0.5*	0.5**	50
Vid	Mildiu	*Plasmopara viticola*	0.5 - 0.6	21	100
Páprika	Azul o Hielo	*Phytophthora capsici*	0.75 - 1.0	14	130
Cebolla	Mildiu	*Peronospora destructor*	0.75	7	50
Mandarina	Gomosis del cuello	*Phytophthora nicotianae*	0.5 - 0.6*	14	75
Arándano	Pudrición radicular	*Phytophthora cinnamomi*	0.75 - 1.0	0	2

LMR: Límite máximo de residuos PC: Periodo de carencia

(*)SANADOR se prepara diluyendo la dosis en un cilindro de 200 L, de ésta solución se aplica 4 L por árbol dirigido al cuello de planta.

(**)12 horas