Supermill 90 P.S.

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE - SP

Composición:

Methomyl	900 g/kg
Aditivos	100 g/kg
TOTAL	1000 g/kg

"VENTA SOLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Reg. PQUA Nº 1509-SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar Nº 991 Piso 9 - Magdalena del Mar.
Telf.: 501-1000/ Fax: 262-8403

FORMULADO POR:
ZHEJIANG TIDE CROPSCIENCE CO., LTD.
Road 1, Mahai Industrial Garden,
Paojiang Industrial Zone, Zhaoxing,
Zhejiang Province. China

DROKASA PERU

DISTRIBUIDO POR:
DROKASA PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1kg
Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

® Marca Registrada

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

-Este producto es TÓXICO, no ingerir. Puede ser fatal si es inhalado. No respire la aspersión.
-No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para reingresar el área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
-Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

-Grupo químico: Organofosforado
-En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
-En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
-En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
-En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante agua y jabón.
-En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y transladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
Nota al médico: Antídoto: No tiene antídoto. Brindar tratamiento con atropina y de soporte.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0800-1-30-40
ESSALUD: 0800-102000 (línea gratuita) DROKASA PERÚ S.A.: (01) 501-1000

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-Manipular los envases con cuidado para evitar roturas y derrames.
-Después de usar el contenido, inutilice el envase, triturándolo o perforándolo y depositelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.
-No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

-Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
-Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-El producto no debe aplicarse en zonas con napas fregáticas superficiales o en suelos altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositarla en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INDICACIONES DE USO

SUPERMILL 90 P.S., es un insecticida de amplio espectro de acción y efecto inmediato, actúa por contacto, ingestión y posee actividad sistémica ascendente, también es translaminar cuando es aplicado al área foliar. Recomendado para usarse en el control de plagas como: caballada, cogollero, gusanos del fruto, barrenador y trips en los cultivos de alfalfa, maíz, tomate, zapallo y espárrago, respectivamente.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

SUPERMILL 90 P.S. , se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con cualquier equipo de aspersión terrestre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

SUPERMILL 90 P.S., debe ser aplicado cuando se observen los primeros daños en el cultivo. Repetir la aplicación cada 14 días, dependiendo de la infestación de la plaga. Puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese al área tratada hasta 2 días después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

SUPERMILL 90 P.S. , es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (dias)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g/200 litros		
Alfalfa	Caballada	*Anticarsia gemmatalis*	0.3 - 0.4	150 - 200	0(*)	10
Maíz	Cogollero	*Spodoptera frugiperda*	0.5 - 0.7	250 - 350	3	0.1
Tomate	Gusano del fruto	*Prodenia eridania*	0.5 - 1	250 - 500	2	1
Zapallo	Barrenador	*Diaphania nitidalis*	0.5 - 0.7	250 - 350	3	0.2
Espárrago	Trips	*Thrips tabaci*	0.4	200	1	2
	Comedor de hojas y brotes	*Spodoptera frugiperda*	0.4 - 0.5	-	1	2
		Heliothis virescens	0.4 - 0.5	-	1	2
	Gusano de tierra	*Agrotis ipsilon*	0.4 - 0.5	-	1	2
	Mosca blanca	*Bemisia tabaci*	-	200 - 250	1	0.02
Alcachofa	Comedor de hojas y brotes	*Spodoptera frugiperda*	0.4 - 0.5	200 - 250	7	0.05
Palto	Quereza	*Fiorinia fioriniae*	-	250 - 300	1	2
Páprika/Jalapeño/Piquillo Morrón/ Guajillo	Gusano comedor de hojas y brotes	*Heliothis virescens*	0.4 - 0.5	200 - 250	3	1
		Spodoptera frugiperda	-	200 - 250	3	2
Mandarina	Quereza coma	*Lepidosaphes beckii*	-	250 - 300	1	2
Vid	Trips	*Thrips tabaci*	1 - 1.5	-	7	5
Fresa	Trips	*Thrips tabaci*	-	200	14	0.05
Palto	Chinche	*Dagbertus peruanus*	-	100 - 200	7	0.02

L.M.R = Límite máximo de residuos (*) En caso de alimento o pastoreo de animales 7 días P.C.= Periodo de carencia