


PISTOLERO®

FICHA TÉCNICA

IDENTIDAD

Nombre común: Cyproconazole
Nombre químico: (2*RS*,3*RS*;2*RS*,3*SR*)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

Fórmula estructural:



Formula empírica: C₁₅H₁₈ClN₃O
Peso molecular: 291.78 g/mol
Grupo químico: Triazole

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Concentración: Cyproconazole 100 g/L
Formulación: Concentrado soluble - SL
Apariencia: Líquido
Color: Amarillo claro a amarillo
Olor: Característico
Densidad: 1.01 ± 0.05 kg/L
pH: 4.0 – 7.0
Estabilidad: Almacenados en sus envases originales, bajo condiciones normales mantiene sus características cualitativas por 2 años.

REGISTRO SENASA: PQUA N° 1923 - SENASA

TOXICOLOGÍA

DL₅₀ Oral aguda: > 2000 mg/kg

DL₅₀ Dermal aguda: > 4000 mg/kg

Categoría Toxicológica:

Ligeramente peligroso – Cuidado

Banda Toxicológica: Azul

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fungicida sistémico y de contacto, se absorbe rápidamente por la hoja, con translocación acropétala.
- ✓ Controla enfermedades en los cultivos de manera preventiva y curativa.

MODO DE ACCIÓN

PISTOLERO es un fungicida sistémico y de contacto con acción protectante, curativa y erradicante.

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibidor de demetilación esterol:

Inhibe las enzimas requeridas para formar esteroides (lípidos), compuestos ubicados entre ciertos fosfolípidos en la membrana celular que regula la permeabilidad de la membrana. Inhibe la producción de esterol por lo tanto lleva a un filtrado inadecuado por la membrana celular, y permite que materiales no deseados se acumulen en la célula.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Preparación

Se prepara echando la dosis indicada que se va a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, se agita bien hasta obtener una mezcla homogénea y se completa la cantidad de agua. Se agita y se procede a su aplicación

Aplicación

Puede ser aplicado con pulverizador manual, atomizadora o equipo tractorizado, de preferencia con boquilla de tipo cono vacío.

Momento de aplicación

Puede ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Frecuencia y época de aplicación

Se recomienda realizar una aplicación/campaña/año.

Periodo de reingreso: 24 horas

DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/ha	PC días	LMR ppm
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>	0.80 - 0.85	30	0.1

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos

COMPATIBILIDAD

PISTOLERO es compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en los cultivos recomendados.

PRIMEROS AUXILIOS

- ✓ En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- ✓ No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- ✓ En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- ✓ En caso de EMERGENCIAS llame a:
 CETOX Teléfono: 273 2318; Celular: 999 072 933
 ESSALUD Teléfono: 423-7600
- ✓ NOTA AL MÉDICO: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.
- ✓ No hay antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelos triturándolos o perforándolos y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

No contamine fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos y drenajes con los desechos y envases vacíos.



Devuelva los envases vacíos de agroquímicos correctamente triple lavados a los centros de acopio de Campo Limpio.
operaciones@campolimpio.org.pe
www.campolimpio.org.pe



¡PISTOLERO UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!