

Nombre: **POUNCE®**

Abril 2021

Of. 1203. San Isidro, Lima – Perú

Nombre: **POUNCE®**

Teléfonos de emergencia toxicológica:

SAMU: 106

CISPROQUIM®: 080-050-847

FMC LATINOAMERICA SUCURSAL: 421 4811

Abril 2021

Teléfonos De Emergencia Química:

CHEMTREC (+ 51) 17071295



Página 1 de 2

FICHA TECNICA

POUNCE®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Reg. PQUA Nro. 083-96-SENASA

Titular del Registro: FMC LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN:

Permethrin..... 384.7 g/l

Aditivos..... 1 L

GENERALIDADES

El insecticida **Pounce®** es un piretroide sintético que ha demostrado una alta actividad, controlando insectos de importancia económica en diversos cultivos. Tiene una buena fotoestabilidad, actúa por ingestión y contacto.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Común	Técnico	ml/ha	ml/200 L		
Papa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	100- 120	50-60	7	0.05
Tomate	Gusano del fruto	<i>Prodenia eridania</i>	100-120	50-60	7	1
	Polilla	<i>Tuta absoluta</i>				
Alcachofa	Mosca minadora	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	120-160	60-80	N.A	5
	Gusano defoliador	<i>Spodoptera eridania</i>	-	80-150		
Pimiento	Gusano perforador	<i>Spodoptera eridania</i>	-	80-150	N.A	0.5
	Gusano perforador del fruto	<i>Symmetrichena capsicum</i>	200-400	-		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	100-150	1	0.1

P.C.: Período de carencia (en días). **L.M.R.:** Límite máximo de residuos en ppm . **N.A:** No aplica.

Periodo de Reingreso: 24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Dependiendo del nivel de infestación de la plaga, las aplicaciones se pueden realizar con frecuencias de 7 a 10 días.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se llena con agua (volumen/ hectárea, de acuerdo al equipo a usar, asegurándose en todo caso, un buen cubrimiento) hasta un tercio del depósito a usar, se agrega la cantidad correspondiente de **Pounce®**, completando luego la capacidad del recipiente, después de una ligera agitación se tiene una emulsión estable, lista para ser aplicada.

FITOTOXICIDAD Y COMPATIBILIDAD

- **Pounce®** no presenta efectos fitotóxicos en los cultivos y en las dosis aquí señaladas.
- **Pounce®** compatible con plaguicidas de uso común, excepto con los de reacción alcalina. La mezcla debe hacerse en tanque de aplicación y aplicarse el mismo día.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroides
- En caso de ingestión; enjuague la boca con agua. Dilúyalo dándole 1 ó 2 vasos de agua. No induzca al vómito. No suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente.
- En caso de inhalación: Se recomienda reposo, respirar aire fresco. Buscar ayuda médica.
- Tras caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- Tras caso de contacto con los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante 15 minutos y con los párpados abiertos.
- En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y dele copia de esta etiqueta. No existe antídoto específico. Tratamiento Sintomático.

GUIA PARA EL MÉDICO

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE
O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA**

OTRA INFORMACIÓN

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO, TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. REALIZAR OBLIGATORIAMENTE EL TRIPLE LAVADO DEL PRESENTE ENVASE.

DEVUELVA EL ENVASE TRIPLE LAVADO AL CENTRO DE ACOPIO AUTORIZADO.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**