

DK-RODEN

Bloques


(Brodifacouma 0.005 % p/p)

RODENTICIDA DE USO DOMÉSTICO, INDUSTRIAL Y EN SALUD PÚBLICA

IDENTIDAD

- Nombre Común: Brodifacouma
- Nombre Químico:
3(3-4' bromobifenil-4-il)1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil-4-hidroximarina

- Fórmula estructural:



- Formula empírica : $C_{31}H_{23}BrO_3$
- Peso molecular : 523.44
- Formulación : Cebo en Bloques
- Autorización sanitaria DIGESA:
Nº 0132-2017/DSA/DIGESA/SA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado Físico : Sólido
- Color : Rojo
- Olor : A cereal.
- Punto de Fusión : 235.8°C
- Densidad : 1.418 gr/ml a 25°C
- Presión de Vapor : < 0.001 mPa a 20°C
- Solubilidad en agua: 5.80×10^{-5} (pH 5) 20°C.
- Soluble en solventes orgánicos:
 - Cloroformo 3 ml/l
 - Acetona 20 mg/l
 - Benceno < 6 mg/l
- Estabilidad : Estable mínimo por 2 años a temperatura ambiente, en envases originales cerrados y sellados herméticamente.

- Flamabilidad : Inflamable
- Explosividad : No Explosivo
- Corrosividad : No corrosivo

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

DK-RODEN BLOQUES, es un poderoso rodenticida anticoagulante de última generación que controla eficazmente ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*) y ratones (*Mus musculus*).

Controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1.3 g en ratas y 0.2 g en ratones, el cebo no produce rechazo, ya que la muerte de los roedores ocurre a partir del tercer día de la primera ingesta

DK-RODEN BLOQUES, contiene benzoato de denatonium (Bitrex), amargante que previene la ingestión humana accidental aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectado por los roedores.

DK-RODEN BLOQUES es antagonista de la vitamina K. El principal sitio de acción es el hígado, donde varios de los precursores de la coagulación de la sangre experimentan dependencia de la vitamina K

TOXICIDAD

DK-RODEN BLOQUES es un rodenticida con sustancia tóxica Clase IV OMS

DL₅₀ oral aguda (formulado): > 8,400mg/kg
DL₅₀ dermal aguda (formulado): > 2,000 mg/kg

CATEGORIA: CUIDADO puede ser peligroso
CUADRO DE USOS Y DOSIS

AMBIENTE	ROEDOR	INFESTACION
Para uso en Salud Pública e Industrial	Ratas	Colocar 1-2 bloques cada 5 a 10m.
	Ratones	Colocar 1 bloque cada 3 a 6m.

INSTRUCCIONES DE USO

DK-RODEN BLOQUES, es un rodenticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el uso doméstico, Industrial y Salud Pública.

- Aplicar **DK-RODEN BLOQUES**, tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (heces, huellas, manchas, etc.)
- En exteriores, colocar **DK-RODEN BLOQUES** y cubrirlos, ya que los roedores se alimentan en lugares protegidos.
- En acequias y desagües usar un gancho de alambre para insertar los bloques y colgarlos o fijarlos, en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).
- Si la infestación es alta utilizar la distancia menor de ubicación señalada en el cuadro de dosis.
- Para prevenir una nueva infestación, se recomienda mantener algunos puntos permanentes con **DK-RODEN BLOQUES** (puntos críticos), y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.
- En caso de nuevos roedores repita la aplicación a los 7 días hasta que cese el consumo.
- Complemente el uso de **DK-RODEN BLOQUES** con una correcta limpieza y aseo del lugar.

PRECAUCIONES

DK-RODEN BLOQUES es un rodenticida que actúa por ingestión, por lo que se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Lea detenidamente la etiqueta antes de usar el producto.
- No coma, no fume, ni beba durante la aplicación.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa.
- Utilice ropa protectora, guantes, botas y máscara durante la aplicación.

- No debe transportarse ni almacenarse con productos alimenticios, bebidas, forrajes, medicinas o cualquier otro tipo de alimento tanto de uso humano como de animales domésticos.

PRIMEROS AUXILIOS

En el caso de ingestión involuntaria, dirigirse al centro médico más cercano (muestre la etiqueta).

Aviso para los médicos: Antídoto: la Vitamina K1 (Fitomenadiona o Fitoquinona). Determine el tiempo de Protrombina en no más de 18 horas después del consumo. Si se eleva, administre Vitamina K1 hasta que el tiempo de Protrombina se normalice. Continúe la determinación del tiempo de Protrombina por dos semanas después que ya se haya retirado el antídoto y reanude el tratamiento, si hubiese una elevación en ese tiempo.

¡DK-RODEN BLOQUES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!